

# LA SÉCURITÉ SUR LA ROUTE COMMENCE SUR VOTRE TABLE DE NUIT

REGARDEZ LES PICTOGRAMMES PRÉSENTS SUR VOS BOÎTES DE MÉDICAMENTS



# Médicaments & conduite

**ADOPTÉZ LES BONS RÉFLEXES**



La prise de médicaments n'est pas un geste anodin. Conduire après avoir pris certains médicaments comporte des risques. Pour éviter tout danger, ayez les bons réflexes et demandez conseil à votre pharmacien.



0,5G/L  
DANS LE SANG

FLASH

## **Les conseils qui vont suivre concernent :**

- la conduite de tout type de véhicules  
(voiture, poids lourd, deux-roues motorisés)  
et l'utilisation de certaines machines ;
- les médicaments prescrits par le médecin  
ou disponibles sans ordonnance.



0,5g/L  
DANS LE SANG

**1**

**Consultez la notice  
avant la prise du médicament**

## **Lisez attentivement la notice.**

Les effets ayant des conséquences sur la conduite peuvent se trouver dans les rubriques :

- conducteurs et utilisateurs de machines ;
- mises en garde et précautions d'emploi ;
- effets indésirables.



2

Identifiez le pictogramme



Les boîtes des médicaments présentant un **risque pour la conduite** comportent un **pictogramme spécifique**.  
Ils sont **classés en trois catégories, selon le niveau de risque du médicament**.



**NIVEAU 1**

**Soyez prudent**

Ne pas conduire  
sans avoir lu la notice

**La prise du médicament ne remet généralement pas en cause la conduite de véhicules**, mais nécessite que vous soyez informé-e avant de prendre le volant et que **vous restiez vigilant-e** quant à une manifestation éventuelle des effets signalés dans la notice.



**NIVEAU 2**

**Soyez très prudent**

Ne pas conduire sans l'avis  
d'un professionnel de santé

**La prise du médicament peut remettre  
en cause votre capacité à conduire.  
Il est nécessaire de demander l'avis de votre  
médecin ou de votre pharmacien.**



**NIVEAU 3**

## **Attention, danger : ne pas conduire**

Pour la reprise de la conduite,  
demandez l'avis d'un médecin

**La prise du médicament  
rend la conduite dangereuse.**

Avant de recommencer à conduire, demandez l'avis de votre médecin. S'il s'agit d'un médicament sans prescription médicale, demandez l'avis de votre pharmacien.



0,5g/L  
DANS LE SANG

**3** Précisez à votre médecin  
traitant et à votre pharmacien  
votre mode de déplacement



Le médecin, ou le pharmacien, peut ainsi rechercher le médicament **qui altère le moins possible vos capacités à conduire.**

De plus, indiquez tous les autres médicaments que vous prenez, afin qu'il puisse tenir compte d'éventuelles interactions.



0,5g/L  
DANS LE SANG

**4**

**Ne modifiez pas ou n'arrêtez pas votre traitement sans l'avis d'un professionnel de santé**

Afin de limiter les risques pour la conduite,  
**respectez les heures et les conditions  
de prise de votre médicament.** Ne modifiez  
pas les doses ou n'arrêtez pas votre traitement  
**sans l'avis d'un professionnel de santé.**



0,5 g/L  
DANS LE SANG

**5**

**Soyez attentif  
aux signes d'alerte**

Ne prenez pas le volant ou arrêtez de conduire  
**si vous ressentez de la fatigue**  
**ou des effets secondaires** tels que  
des engourdissements, des tremblements,  
des nausées, des vertiges, etc.



0,5g/L  
DANS LE SANG

**6** Ne multipliez pas  
les risques

**En cas de fatigue**, les effets indésirables des médicaments sur la conduite sont décuplés. La prise simultanée de médicaments **avec de l'alcool et/ou des drogues**, en particulier le cannabis, multiplie les risques d'accident.



**Cespharm+**  
ÉDUCATION ET PRÉVENTION  
POUR LA SANTÉ

**ansm**  
Agence nationale de sécurité du médicament  
et des produits de santé

**SÉCURITÉ ROUTIÈRE**  
**TOUS RESPONSABLES**

