

**Certaines choses
peuvent être similaires...
et pourtant différentes**



1 patient sur 4 atteint de Maladie Coéliquae a d'abord été traité pour un Syndrome de l'Intestin Irritable¹.

Parlez-en avec votre biologiste, votre médecin ou votre pharmacien
Renseignez-vous sur www.afdiag.fr



1. Green PHR et al., Am J Gastroenterol. 2001;96(1):126-131
Campagne d'information réalisée avec le soutien institutionnel de Thermo Fisher Scientific.

LA MALADIE COËLIAQUE ET VOUS

La maladie cœliaque est encore trop peu connue des médecins et le chemin qui mène au diagnostic de la maladie est souvent long et sinueux.

Vous posez-vous les bonnes questions ?

Êtes-vous bien diagnostiqué ?

1/ Avez-vous déjà ressenti **des symptômes dont vous ne connaissiez pas la cause ?**

2/ Ressentez-vous **une fatigue chronique**, avez-vous **des carences en fer** depuis plusieurs années de manière inexpliquée ?

3/ Pensez-vous être dans le cas d'**une errance diagnostique** ?
L'errance diagnostique est la période au cours de laquelle un diagnostic se fait attendre, ou simplement l'absence d'un diagnostic pertinent

4/ Avez-vous pensé que **le gluten pouvait être la cause** de vos symptômes ?

QUELQUES CHIFFRES

2/3 des malades sont des femmes

Les symptômes sont variés (anémie, diarrhées, fatigue, amaigrissement ...). Il n'existe pas de médicament. Le seul traitement est le régime sans gluten strict à vie.

670 000 personnes seraient atteintes en France = 1% de la population

La maladie cœliaque se développe à n'importe quel âge de la vie.

N'hésitez pas à en parler avec votre médecin, biologiste ou pharmacien !

LE DIAGNOSTIC DE LA MALADIE

La maladie cœliaque est l'intolérance permanente au gluten. Cette maladie auto-immune provoque une destruction des villosités de l'intestin grêle.

Ne débutez pas un régime sans gluten avant d'avoir fait les bons examens ! Vos analyses risquent d'être faussées et d'entraîner un faux diagnostic.

Comment lire vos résultats ?

Prise de sang remboursée par la sécurité sociale sur prescription
Dosage des anticorps IgA anti-transglutaminase tissulaire (IgA anti-tTG)

TAUX D'ANTICORPS ÉLEVÉ

Votre médecin va vous rediriger vers un gastro-entérologue

Endoscopie avec biopsies du duodénum
Examen réalisé par voie buccale

SI POSITIF

Une atrophie villositaire est détectée

Vous êtes atteint de la maladie cœliaque et donc intolérant permanent au gluten

TAUX D'ANTICORPS NORMAL

Si un déficit est avéré en IgA totales, doser les IgG anti-tTG

IgG tTG

TAUX ÉLEVÉ

TAUX NORMAL

Envisager un autre diagnostic

Les tests d'intolérances alimentaires, immunotests ou tests urinaires se répandent mais n'ont aucune validité scientifique pour le diagnostic de l'intolérance au gluten.





AFDIAG

**L' Association Française Des Intolérants
Au Gluten (AFDIAG)** accompagne les
malades cœliaques et les hypersensibles
au gluten depuis de nombreuses années.

- / Un accueil téléphonique du lundi au vendredi.
- / Un site Internet
avec de nombreuses informations.
- / Des colloques médicaux
pour mieux comprendre la maladie.
- / Des randonnées et des ateliers « sans gluten ».
- / Des stages d'éducation nutritionnelle
pour les enfants et les adolescents.
- / Un groupe « jeunes adultes »
qui organise de nombreuses activités.
- / Des délégués en région
pour plus de proximité.

CONTACT

Secrétariat de l'AFDIAG
afdiag@gmail.com

Tél. : 01 56 08 08 22
Fax. : 01 56 08 08 42
www.afdiag.fr

Si vous avez des questions ou toute autre demande,
CONTACTEZ-NOUS !