



FICHE PRATIQUE SUR L'UTILISATION DU VACCIN COMIRNATY® JN.1 ADULTE (12 ans et +) FLACON A COUVERCLE GRIS

Un nouveau vaccin adapté monovalent est dorénavant disponible. Il s'agit du vaccin **Comirnaty® JN.1 30 µg/dose**, développé par Pfizer/BioNTech. Son AMM a été approuvée le 03 juillet 2024 par l'Agence Européenne du Médicament. Cette présentation possède **un couvercle gris**.

Le vaccin Comirnaty® JN.1 30 µg/dose à destination des personnes âgées de 12 ans et + est constitué de l'ARN messager du sous-lignage JN.1 du virus Sars-Cov-2. Le vaccin doit être utilisé selon un schéma de vaccination qui prévoit l'injection d'une seule dose de vaccin quel que soit le passé vaccinal du sujet.

Les flacons de vaccin Comirnaty® JN.1 30 µg/dose sont des flacons multidoses d'un volume total de 2,25 mL. Ainsi, le flacon comporte 6 doses d'un volume de 0,3 mL chacune. Chaque dose vaccinale contient 30 µg d'ARNm contre la souche JN.1.

A partir d'un flacon de vaccin Comirnaty® JN.1 (30 µg/dose), le préparateur devra donc préparer 6 seringues de 0,3 mL. Des seringues de 1 mL devront être utilisées.

Les dispositifs médicaux à utiliser (seringues et aiguilles) demeurent identiques. Cette présentation **ne nécessite pas de dilution ni de reconstitution préalable avant utilisation** : les doses sont à prélever directement dans le flacon livré et décongelé.

Le vaccin Comirnaty® JN.1 (forme 12 ans et +, couvercle gris) se conserve :

- **18 mois** à une température comprise entre -90 °C et -60 °C,
- au maximum pendant **10 semaines** dans le réfrigérateur à une température comprise entre **+2°C et +8°C**, dans la limite des 18 mois de conservation entre -90 °C et -60 °C.

I. VERIFICATION DES FLACONS DE COMIRNATY® JN.1 ADULTE

Vérifier que le flacon de vaccin Comirnaty® JN.1 12 ans et + est muni **d'un couvercle en plastique gris**, d'une étiquette bordée de bandes grises et que le nom du produit est bien Comirnaty® JN.1 **30 µg/dose**, dispersion injectable.

II. MANIPULATION DES FLACONS AVANT UTILISATION DE COMIRNATY® JN.1

Si le flacon multidoses est conservé congelé, il doit être décongelé avant utilisation. Pour la décongélation, les flacons congelés doivent être placés à une température de +2°C à +8°C. Pour une boîte de 10 flacons, la décongélation pourra prendre 6 heures. Les flacons congelés peuvent également être décongelés individuellement à température ambiante (jusqu'à +30°C) pendant une durée de 30 minutes.

Veiller à ce que les flacons soient totalement décongelés avant utilisation.

Les flacons non ouverts peuvent être conservés pendant un maximum de 10 semaines entre +2°C et +8°C, dans la limite des 18 mois de conservation entre -90 °C et -60 °C. Aussi, lorsque les flacons sont placés à une température de +2°C à +8°C pour être conservés, la date limite d'utilisation (correspondant à la conservation au réfrigérateur) doit être actualisée sur l'emballage.

Avant utilisation, le flacon non ouvert peut être conservé pendant un maximum de 12 heures à des températures allant jusqu'à +30°C. Les flacons décongelés peuvent être manipulés dans des conditions d'éclairage intérieur.

Mélanger délicatement en retournant le flacon à 10 reprises avant utilisation. **Ne pas secouer.**

Avant le mélange, la dispersion décongelée peut contenir des particules amorphes opaques de couleur blanche à blanc cassé.

Après le mélange, le vaccin doit avoir l'aspect d'une dispersion de couleur blanche à blanc cassé, exempte de particules visibles. Ne pas utiliser le vaccin si la présence de particules ou une coloration anormale sont observées.

III. PRÉPARATION DES DOSES INDIVIDUELLES DE 0,3 mL de COMIRNATY® JN.1

Vérifier que les flacons de vaccin Comirnaty® JN.1, une fois décongelés, sont bien identifiés avec une étiquette, mentionnant le nom du vaccin, le numéro de lot, la date limite d'utilisation.

Effectuer un lavage des mains avec un produit hydro-alcoolique.

En utilisant une technique aseptique, nettoyer le bouchon du flacon à l'aide d'une compresse à usage unique imprégnée d'antiseptique.

Prélever 0,3 mL de solution de vaccin Comirnaty® JN.1.

Des aiguilles et/ou seringues à faible volume mort doivent être utilisées pour pouvoir extraire jusqu'à 6 doses à partir d'un flacon unique. La combinaison de l'aiguille et de la seringue doit avoir un volume mort ne dépassant pas 35 µL.

Chaque dose doit contenir 0,3 mL de vaccin.

Si la quantité de vaccin restant dans le flacon ne permet pas d'obtenir une dose complète de 0,3 mL, jeter le flacon et la solution résiduelle.

Ne pas regrouper les résidus de solution provenant de plusieurs flacons.

Éliminer tout vaccin non utilisé dans les 12 heures suivant la première ponction.

Attention : Une fois la première ponction réalisée, le flacon ouvert peut se conserver 12 heures jusqu'à +30°C. **Toutefois, afin de garantir la stabilité microbiologique du vaccin, il est recommandé de conserver le flacon percé entre +2°C et +8°C entre chaque utilisation.**

IV. INJECTION VACCINALE

Effectuer un lavage des mains avec un produit hydro-alcoolique.

Désinfecter la région deltoïdienne avec une compresse imbibée d'antiseptique alcoolique ou alcool à 70°.

Prendre la seringue pré-remplie de Comirnaty® JN.1. Vérifier que la couleur du liquide va du blanc au blanc cassé dans la seringue.

Vérifier le volume dans la seringue.

Injecter le vaccin par voie intramusculaire :

- Tendre fermement la peau entre l'index et le pouce
- Enfoncez l'aiguille d'un mouvement sûr et rapide perpendiculairement au plan cutané et ne pas aspirer
- Injecter la dose de vaccin Comirnaty® JN.1.
- Comprimer le point d'injection avec une compresse et appliquer un pansement.

Évacuer la seringue et l'aiguille dans le collecteur à objets perforants suivant la filière d'élimination des déchets DASRI.

Effectuer un lavage des mains avec un produit hydro-alcoolique.

Il est recommandé de placer le patient sous surveillance pendant au moins 15 minutes après la vaccination afin de détecter la survenue d'une réaction anaphylactique suivant l'administration du vaccin.



Flacon de vaccin Comirnaty® JN.1, à utiliser chez les 12 ans et +

ATTENTION :

Une vigilance particulière devra être portée lors de la préparation des doses afin d'éviter toute confusion entre :

Un flacon de vaccin Comirnaty® JN.1 Adulte 12 ans et + (couvercle gris)

Un flacon de vaccin Comirnaty® JN.1. Pédiatrique 5-11 ans (couvercle bleu)

Un flacon de vaccin Comirnaty® JN.1 Pédiatrique 6 mois-4 ans (couvercle jaune)

Ceci afin de prévenir toute erreur d'injection. Une dernière vérification avant l'injection est souhaitable.